





<p><b>Tarin noir</b> <i>Carduelis atrata</i></p>	<p>Anglais: Black siskin Néerlandais: Zwarte sijs Allemand ; Scharzzeisig</p>
<p><b>Passériforme, fringillidé</b> <b>Biotope:</b> Le tarin noir habite les régions tempérées de la Cordillère des Andes entre 1800 et 4800 mètres d'altitude, les hauts plateaux et les plaines andines, la <i>puna</i> (plateau sans arbre des hautes Andes), les pentes de montagne rocailleuses et herbeuses. Le tarin noir est une espèce monotypique qui vit dans les Andes du Pérou, de Bolivie, Chili, Argentine.</p>	<p><b>Répartition</b></p> 
<p><b>Description :</b> Le mâle tarin noir adulte a la tête et pratiquement tout le corps noirs à l'exception de la région anale et des sus- caudales qui sont d'un jaune brillant. Le plumage de la femelle est fort semblable à celui du mâle mais légèrement fuligineux ou d'un noir brunâtre avec les extrémités des moyennes et grandes couvertures d'une teinte jaune pâle ou chamois. Les deux montrent un miroir jaune brillant dans les ailes.</p>	
<p><b>Un mâle tarin noir</b> (<i>carduelis atrata</i>). Longueur : 12-13 cm</p>	<p><b>Une femelle</b></p>
 <p>PHOTO P.MALBURET</p>	
<p><b>Standard du mâle</b> PAS de STANDARD actuellement</p>	<p><b>Standard de la femelle</b> PAS de STANDARD actuellement</p>



<p><b>Défauts rencontrés</b>  Pattes écailleuses  Présence de trop de brun dans le noir chez les mâles (couleur pas uniforme)  Plumage fendu dans la poitrine  Plumage souillé dans la région anale  Plumage usé autour des yeux</p>	<p><b>Qualités à rechercher</b>  Plumage noir uniforme, luisant, lustré  Miroir bien net et brillant  Pattes noires</p>
<p><b>Nidification:</b> Le nid fait extérieurement de racines, de fines brindilles, de mousses, et intérieurement de laine, duvet végétal, crins est généralement situé à faible hauteur dans un buisson ou à défaut assez haut dans un arbre au feuillage dense. La femelle pond en général 3 à 5 œufs à fond blanc rosé ou blanc bleuté très pâle marqués de brun ou de brun noir. La durée de l'incubation, tributaire de la température ambiante est typique des autres espèces de tarins sud-américains.</p>	
<p><b>Nourriture à l'état sauvage :</b> Ce tarin se nourrit à même le sol, dans les buissons et les plantes basses où il recherche quelques insectes ainsi que les herbacées de <i>Cortaderia selloana</i>, <i>Gynerium argenteum</i>, voire encore les graines de <i>Tolas leptophyllum</i></p>	
<p><b>Voir fiches des autres carduelis proches cousins :</b>  <i>en gras déjà sur le site</i>  Carduelis spinus  Carduelis citrinella  <b>Carduelis tristis : <i>tarin triste ou chardonneret jaune</i></b>  Carduelis lawrencei  Carduelis psaltria  Carduelis pinus  Carduelis cucullata  Carduelis siemiradzkii  Carduelis notata  Carduelis crassirostris  Carduelis magellanicus  Carduelis olivacea</p>	<p>Carduelis xanthogastra  Carduelis atriceps  Carduelis uropygialis  Carduelis dominicensis  Carduelis yarrellii  Carduelis spinescens  Carduelis barbata</p>
<p><b>Mutations reconnues à l'A.O.B.</b>   <b>AUCUNE</b></p>	<p><b>Hybridation connue :</b>  Avec canari  Avec chardonneret  Avec verdier</p>